

ПРОФИЛАКТИКА ДЕТСКОГО ТРАВМАТИЗМА ЗИМОЙ



УШИБ КОНЕЧНОСТИ



ПРИПУХЛОСТЬ И ГЕМАТОМА



ЛЕГКАЯ БОЛЬ ПРИ ДВИЖЕНИИ



ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ

В первые сутки прикладываем холод: лед, специальные охлаждающие пакеты, продающиеся в аптеках.



Через 24 часа меняем тактику. Место ушиба нужно согреть. Применяем теплые ванны, компрессы и примочки, которые помогут быстрее снять отек и ускорят рассасывание синяка.



ПЕРЕЛОМ



ОСТРЫЙ БОЛЬ



НЕЕСТЕСТВЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РУКИ ИЛИ НОГИ



БЫСТРО НАРАСТАЮЩИЙ ОТЕК В МЕСТЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ



ДЛЯ ОТКРЫТЫХ ПЕРЕЛОМОВ ХАРАКТЕРНО КРОВОТЕЧЕНИЕ, НАЛИЧИЕ КОСТНЫХ ОТЛОМКОВ В РАНЕ

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ



При открытом переломе необходимо остановить кровотечение.



Необходимо обездвижить сломанную конечность.

Не пытайтесь самостоятельно вправить отломки.



Вызовите скорую помощь, дайте любой обезболивающий препарат.



СОТРЯСЕНИЕ МОЗГА



ПОТЕРЯ СОЗНАНИЯ



ПРОВАЛЫ В ПАМЯТИ НА МОМЕНТ ТРАВМЫ



ТОШНОТА



ГОЛОВНАЯ БОЛЬ



ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ



СЛАБОСТЬ,
СОНЛИВОСТЬ



ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ



Обработать раны и забинтовать



При потере сознания
уложить на правый бок,
согнуть колени и левую
руку в локте.



При сохранении и нарастании
симптомов обязательно
обратитесь к врачу.

При большом
количество симптомов
немедленно вызывайте скорую!

ОБМОРОЖЕНИЕ

1 степень



ПОКАЛЫВАНИЯ, ПОЩИПЫВАНИЯ,
УМЕНЬШЕНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ

2 степень




ПОБЛЕДНЕНИЕ КОЖИ

3 степень



ПРИ СИЛЬНОМ ОБМОРОЖЕНИИ
ПОСЛЕ ОТОГРЕВАНИЯ
МОГУТ ПОЯВИТЬСЯ ПУЗЫРИ

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ



Наложите теплоизоляционную повязку,
например: слой марли, слой ваты,
снова марлю, прорезиненную ткань
или марлю, а сверху оберните
шерстяной тканью.

НЕ СЛЕДУЕТ растирать пораженные
участки снегом и отогревать
их в горячей воде.



К предыдущим мероприятиям
добавляем согревание в воде
комнатной температуры,
постепенно повышая её до 35 градусов.

При наличии обморожения

3 степени немедленно обратитесь
за медицинской помощью.

