


Единственное условие, определяющее эффективность химиопрофилактики — это ее своевременное и раннее назначение, не позднее 72 часов с момента укола или пореза.

Кроме того, с момента обращения в Центр СПИДа или к врачу-инфекционисту по месту жительства пострадавшему самому необходимо сдать анализы на ВИЧ и вирусные гепатиты В и С с пересдачей через 3, 6, 9 и 12 месяцев.



Контакты врачей-инфекционистов

КУ «Центр профилактики и борьбы со СПИД»

г. Ханты-Мансийск

ул. Гагарина, 106, корп. 2

Тел.: 8 (3467) 33-18-24, 30-02-36

Филиал в г. Сургуте

ул. Геологическая, 18

Тел.: 8 (3462) 25-41-55, 25-07-72

Филиал в г. Нижневартовске

ул. Спортивная, 19

Тел.: 8 (3466) 43-52-80

Филиал в г. Пыть-Яхе

8 мкр-н., ул. Православная, 10

Тел.: 8 (3463) 42-84-25

Дополнительная информация на сайте:

www.aids-86.info

Издано: КУ «Центр СПИД», г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 106, корпус 2,
тел.: 8 (3467) 33-13-21, в 2016 году.

Составитель: врач-эпидемиолог Бугаева Н.В.

Отпечатано: типография «Репринт» (ООО «ОПС»),

г. Нижний Тагил, ул. Ломоносова, 49. Тел.: 8 (3435) 21-52-10.

Тираж: 2000 экз.



18+

ВНИМАНИЕ, ОПАСНОСТЬ!



Памятка
для родителей



г. Ханты-Мансийск
2016

Все мы слышали о ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитах В и С и думаем, что если мы не ведем рискованный образ жизни (употребление наркотиков и незащищенные половые контакты), то нас это не коснется. Современная жизнь такова, что может преподнести сюрпризы, к сожалению, не всегда приятные. К таким «сюрпризам» относятся уколы использованными шприцами, порезы, попадание чужеродной крови на кожные покровы и слизистые. Случайно уколиться можно на улице, в песочнице, при уборке помещений и т.п.



Чтобы не попасть в данную ситуацию, прежде всего, необходимо провести беседу с ребенком о крайней опасности таких «игрушек» и самим быть осторожными.

Если же ситуации не удалось избежать:

- ♥ не стоит кричать или ругать ребенка, а лучше спросите, что произошло и где он нашел шприц;
- ♥ если из ранки течет кровь, то не останавливайте ее в течение нескольких минут. Если крови нет, выдавливать ее не стоит, так как это может только увеличить риск проникновения вируса в клетки;
- ♥ аккуратно подберите шприц или иглу, поместите его в жесткую упаковку типа закрытой стеклянной банки или бутылки, чтобы шприц при транспортировке не проткнул тару и не уколол других людей, вымойте руки с мылом;

Помните: манипуляции со шприцом должны быть минимальными, иначе могут уколиться все перепуганные родственники, которые могут брать его в руки, разглядывать и перекладывать.

- ♥ обратитесь в ближайший Центр СПИДа или в приемное отделение больницы, чтобы Вам обработали рану и оценили степень риска заражения ВИЧ;
- ♥ уточните, имеется ли возможность исследовать содержимое шприца на ВИЧ-инфекцию и вирусные гепатиты В и С;
- ♥ в случае высокого риска инфицирования или при лабораторном обнаружении ВИЧ в содержимом шприца пострадавшему назначается специфическая химиопрофилактика передачи ВИЧ-инфекции.